



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Lunes 27 Marzo 2017

En el océano Pacífico ecuatorial la temperatura superficial se mantiene en el rango de 27 °C a 30°C, con máximos valores en la región oriental, cerca de Sudamérica; estas temperaturas manifiestan condiciones normales en las regiones occidental a ligeramente frías y en la región central condiciones normales, y condiciones cálidas en la región oriental. En la región Niño 1+2 las temperaturas de 27°C a 29 °C manifiestan condiciones cálidas con anomalías positivas de 0.5 °C a 4 °C, con máximas anomalías frente a las costas del norte del Perú. Por otro lado, en el mar peruano la temperatura superficial se mantiene en el norte entre 27 °C y 28°C, en el centro entre 21 °C y 27 °C y en el sur de 20°C a 24°C, manifestando aún condiciones cálidas frente a la costa norte y centro del Perú, mientras que frente a la costa sur anomalías entre -1°C cerca a la costa y +1°C fuera de las 100 millas.

[Más información puede acceder al COMUNICADO OFICIAL N°. 06-2017\).](#)




Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en el océano Pacífico. Los cuadros en azul son regiones Niño. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN






Figura 2. Izquierda: Temperatura (°C) superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Derecha: Anomalías de la temperatura superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Lunes 27 Marzo 2017

En el litoral peruano, la temperatura superficial del mar continua sobre sus valores normales, con mayor intensidad en la zona norte. Al sur de San Juan, continua presentando valores normales.

Estación	Temperatura Superficial del Mar TSM, (°C)"							
	23/03/2017		24/03/2017		25/03/2017		26/03/2017	
	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM
Talara	26.8	+4.6	26.0	+3.8	26.1	+3.9	26.9	+4.7
Paita	28.6	+5.6	28.4	+5.4	28.6	+5.6	28.5	+5.5
I. Lobos de Afuera	27.6	+5.9	27.0	+5.3	26.7	+5.0	26.6	+4.9
Salaverry	25.8	+6.8	25.4	+6.4	23.4	+4.4	23.2	+4.2
Chimbote	27.3	+4.8	27.9	+5.4	28.2	+5.7	27.9	+5.4
Callao	21.0	+3.4	20.5	+2.9	20.6	+3.0	20.8	+3.2
San Juan	17.5	+1.6	17.5	+1.6	17.2	+1.3	16.9	+1.0
Mollendo	17.3	+0.3	17.3	+0.3	17.3	+0.3	17.5	+0.5
Ilo	16.2	-0.6	16.2	-0.6	16.7	-0.1	16.5	-0.3

Figura 3. Cuadro de la temperatura superficial del mar y anomalías (°C) de las estaciones oceanográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.

Las series de tiempo de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en las estaciones de Paita, Chimbote, Callao e Ilo, mostraron desde el mes de enero hasta octubre de 2015 condiciones superiores al Fenómeno extraordinario El Niño 1982-1983 y similares al Fenómeno extraordinario El Niño 1997-1998. Desde el mes de octubre de 2015 la temperatura superficial del mar empezó a presentar condiciones por debajo de los eventos extraordinarios 1982-1983 y 1997-1998, indicando condiciones cálidas de magnitud fuerte desde el mes de mayo 2015 hasta enero de 2016, según el Índice Costero El Niño (ICEN). Durante el mes de enero del presente año, las estaciones están manifestando un incremento rápido e importante en sus temperaturas, principalmente en la litoral norte debido al arribo de una onda cálida y al ingreso de aguas ecuatorial en la zona norte hasta extenderse hasta el litoral centro y sur. Para el mes de febrero y marzo las condiciones continúan cálidas particularmente en la costa norte y centro, mientras que en el litoral sur viene presentando valores cercanos a su normal.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

NIVEL MEDIO DEL MAR



Lunes 27 Marzo 2017

La DHN para el monitoreo del nivel del mar en tiempo real, cuenta actualmente con 11 estaciones mareográficas instaladas a lo largo del litoral peruano.

El nivel medio del mar en el litoral peruano en los últimos días presenta ligero incremento en la zona norte, presentando una anomalía máxima de 19 cm en Talara y Paíta. En tanto, al sur de Chimbote los niveles se mantienen con valores alrededor de su nivel normal.

Estación	Nivel Medio del Mar (NMM, m)							
	23/03/2017		24/03/2017		25/03/2017		26/03/2017	
	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM
Talara	1.01	+0.10	1.01	+0.10	1.05	+0.14	1.10	+0.19
Paíta	0.93	+0.10	0.95	+0.12	0.99	+0.16	1.02	+0.19
I. Lobos de Afuera	0.80	+0.05	0.81	+0.06	0.84	+0.09	0.86	+0.11
Chimbote	0.70	+0.07	0.70	+0.07	0.71	+0.08	0.72	+0.09
Callao	0.56	-0.03	0.58	-0.01	0.59	0.00	0.63	+0.04
Pisco	0.52	+0.02	0.52	+0.02	0.52	+0.02	0.56	+0.06
San Juan	0.48	+0.03	0.48	+0.03	0.49	+0.04	0.51	+0.06
Matarani	0.53	-0.03	0.53	-0.03	0.52	-0.04	0.53	-0.03

Figura 4. Cuadro de nivel medio del mar y anomalías (m) de las estaciones mareográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.






Figura 5. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Talara, Paita, Isla Lobos y Chimbote del día 26-03-2017 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Los registros mareográficos provienen de las estaciones automáticas compuestas por un sensor de nivel tipo radar, marca Geónica modelo Datamar 2000C, de muestreo al segundo y registro promediado al minuto, con transmisión de información cada diez minutos vía red celular (GPRS), administrada por esta Dirección. A partir de estos registros, se pueden realizar investigaciones científicas como: las variaciones del nivel del mar durante Fenómenos como El Niño, La Niña, movimientos de la corteza terrestre y cambios climáticos; como agente modificador de la costa (transporte y sedimentación de material) y su influencia sobre el ecosistema de la zona intermareal, etc. Los mareógrafos también registran las manifestaciones de los seiches, bravezas de mar y tsunamis.







Figura 6. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Callao, Pisco, San Juan y Matarani, del día 26-03-2017 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Los registros mareográficos del litoral norte del Perú tienen características de oleajes de ligera intensidad.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

PRESIÓN Y OLAS

Lunes 27 Marzo 2017

El sistema de Alta Presión del Pacífico Sur para el 27 y 28 de marzo presentaría una presión de 1020 hPa, con una posición cerca a la costa, generando vientos en el Pacífico oriental hasta 20 nudos. Asimismo, el modelo WWATCH III muestra para el 26 y 27 de marzo frente a la costa norte y sur vientos menores de 10 nudos, mientras que frente a la costa centro vientos entre 8 nudos y 14 nudos. Por otro lado, el mismo modelo muestra frente al litoral peruano, alturas de olas de 1.4 m a 1.6 m en la zona norte, de 1.5 m a 1.7 m en la zona central y sur. Los periodos de las olas picos presentarían entre 12 s y 16 s. Ver aviso especial [Ver aviso especial](#)






Figura 7. Sistema de Alta Presión del océano Pacífico Sur. Fuente: Datos: NCEP-NOAA; Gráficos: DHN






Figura 8. Series de tiempo de la velocidad del viento (nudos), altura de olas (m), periodo de la ola (s) e índice de la potencia del oleaje (Kw/m) frente a las costas de Talara, Callao e Ilo, del 27-03-2017 al 03-04-2017 Fuente: Datos: modelo WWATCH III; Grafico: DHN