



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Miércoles 4 Octubre 2017

En el Pacífico ecuatorial, en la región occidental se mantiene predominando condiciones normales, en la región central condiciones entre normales a ligeramente frías, mientras que en la región oriental las condiciones se presentan frías con anomalías negativas hasta de 4°C. Las isoterms superficiales se mantienen distribuidas de 27°C a 30°C en la región occidental, de 23°C a 28°C en la región central, y de 18°C a 23°C en la región oriental. En la región Niño 1+2 la distribución de las isoterms se mantienen de 17°C a 20°C; sin embargo, frente a Ecuador las isoterms alcanzan valores de 25°C generándose en esta zona anomalías positivas, mientras que en gran parte de esta región Niño 1+2 predominan condiciones frías, con anomalías negativas hasta de 2°C. En el mar peruano continúan predominando temperaturas entre 16°C y 18°C, manifestando el predominio de condiciones normales a frías. En los últimos días se observó la presencia de núcleos cálidos cerca al costa, particularmente frente a Tumbes y Pisco.




Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en el océano Pacífico. Los cuadros en azul son regiones Niño. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN





Figura 2. Izquierda: Temperatura (°C) superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Derecha: Anomalías de la temperatura superficial en el océano Pacífico Sur orient. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Miércoles 4 Octubre 2017

En el litoral peruano, las temperaturas en la superficie del mar predominaron alrededor de su valor normal del mes. En las estaciones de la Isla Lobos y el extremo sur las anomalías se encontraron por debajo de su normal.

| Estación | Temperatura Superficial del Mar TSM, (°C)" | | | | | | | |
|--------------------|--|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | 30/09/2017 | | 01/10/2017 | | 02/10/2017 | | 03/10/2017 | |
| | TSM | ATSM | TSM | ATSM | TSM | ATSM | TSM | ATSM |
| Talara | 17.7 | -0.1 | 18.3 | 0.0 | 18.9 | +0.6 | 18.3 | 0.0 |
| Paita | 17.2 | +0.6 | 17.3 | +0.2 | 17.7 | +0.6 | 17.2 | +0.1 |
| I. Lobos de Afuera | 16.4 | -0.7 | 16.4 | -0.7 | 16.2 | -1.1 | 16.1 | -1.2 |
| Salaverry | 15.7 | -0.2 | 15.4 | -0.4 | 15.8 | 0.0 | 15.3 | -0.5 |
| Chimbote | 18.0 | -0.5 | 18.4 | -0.5 | 18.2 | -0.7 | 18.5 | -0.4 |
| Callao | 15.1 | 0.0 | 15.0 | -0.1 | 15.7 | +0.9 | 16.8 | +2.0 |
| San Juan | 13.4 | -0.2 | 13.3 | -0.4 | 13.4 | -0.3 | 13.4 | -0.3 |
| Mollendo | 14.6 | -0.2 | 14.7 | -0.1 | 14.4 | -0.5 | 14.1 | -0.8 |
| Ilo | 13.6 | -1.1 | 13.5 | -1.4 | 12.9 | -2.0 | 13.4 | -1.5 |

Figura 3. Cuadro de la temperatura superficial del mar y anomalías (°C) de las estaciones oceanográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.

En las series de tiempo diaria de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) frente a Paita, Chimbote, Callao e Ilo muestran de enero a octubre de 2015 condiciones superiores al evento El Niño 1982-1983 y similares al El Niño 1997-1998; sin embargo, desde octubre de 2015 la temperatura disminuyó alcanzando valores por debajo de las temperaturas de estos dos eventos, indicando condiciones cálidas de magnitud fuerte desde el mes de mayo 2015 hasta enero de 2016, según el Índice Costero El Niño (ICEN). Durante enero de 2017 se presentó un incremento rápido e importante de las temperaturas superficiales, principalmente en el litoral norte del Perú, debido al arribo de una onda cálida y al ingreso de Aguas Ecuatoriales, que se extendieron hacia el litoral centro y sur, en los meses de febrero y marzo, particularmente en la costa norte y centro. En los meses de abril y mayo la temperatura disminuyó gradualmente gracias a la influencia de la intensificación de los vientos frente a la costa peruana. En este último mes de agosto y setiembre las temperaturas han disminuido gradualmente respecto a los dos últimos meses, presentando condiciones dentro de su normal hasta condiciones ligeramente frías.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

NIVEL MEDIO DEL MAR


Miércoles 4 Octubre 2017

La DHN para el monitoreo del nivel del mar en tiempo real, cuenta actualmente con 11 estaciones mareográficas instaladas a lo largo del litoral peruano.

A continuación se presenta los promedios diarios de las ocho estaciones costeras, obteniendo niveles alrededor de sus niveles normales.

| Estación | Nivel Medio del Mar (NMM, m) | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 30/09/2017 | | 01/10/2017 | | 02/10/2017 | | 03/10/2017 | |
| | NMM | ANMM | NMM | ANMM | NMM | ANMM | NMM | ANMM |
| Talara | 0.85 | +0.02 | 0.87 | +0.03 | 0.87 | +0.03 | 0.84 | 0.00 |
| Paita | 0.75 | +0.01 | 0.77 | +0.02 | 0.77 | +0.02 | 0.75 | 0.00 |
| I. Lobos de Afuera | 0.65 | -0.03 | 0.67 | -0.02 | 0.69 | 0.00 | 0.68 | -0.01 |
| Chimbote | 0.52 | -0.03 | 0.53 | -0.03 | 0.54 | -0.02 | 0.57 | +0.01 |
| Callao | 0.43 | -0.07 | 0.45 | -0.06 | 0.47 | -0.04 | 0.46 | -0.05 |
| Pisco | 0.33 | -0.07 | 0.38 | -0.03 | 0.40 | -0.01 | 0.38 | -0.03 |
| San Juan | 0.37 | 0.00 | 0.37 | -0.01 | 0.38 | 0.00 | 0.40 | +0.02 |
| Matarani | 0.46 | -0.01 | 0.45 | -0.03 | 0.46 | -0.02 | 0.45 | -0.03 |

Figura 4. Cuadro de nivel medio del mar y anomalías (m) de las estaciones mareográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.







Figura 5. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Talara, Paíta, Isla Lobos y Chimbote del día 03-10-2017 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Los registros mareográficos provienen de las estaciones automáticas compuestas por un sensor de nivel tipo radar, marca Geónica modelo Datamar 2000C, de muestreo al segundo y registro promediado al minuto, con transmisión de información cada diez minutos vía red celular (GPRS), administrada por esta Dirección. A partir de estos registros, se pueden realizar investigaciones científicas como: las variaciones del nivel del mar durante Fenómenos como El Niño, La Niña, movimientos de la corteza terrestre y cambios climáticos; como agente modificador de la costa (transporte y sedimentación de material) y su influencia sobre el ecosistema de la zona intermareal, etc. Los mareógrafos también registran las manifestaciones de los seiches, bravezas de mar y tsunamis.







Figura 6. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Callao, Pisco, San Juan y Matarani, del día 03-10-2017 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Los registros mareográficos muestran condiciones normales del mar.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

PRESIÓN Y OLAS

Miércoles 4 Octubre 2017

Para el 04 y 05 de octubre el sistema de alta presión del Pacífico Sur se configuraría elongado longitudinalmente desde los 160°W hasta cerca de los 075°W, con su núcleo de 1028 hPa disminuyendo a 1024 hPa, asociado a vientos menores de 16 nudos frente a Perú. Asimismo, para la misma fecha de setiembre el modelo WWATCH III muestra vientos hasta 16 nudos frente a las costas del norte y centro, y vientos menores de 12 nudos frente a las costas del sur. Por otro lado, el mismo modelo WWATCH III muestra alturas de olas en el norte y centro de 2.0 m que disminuirían a 1.8 m., en el sur alturas de olas de 2.0 m que disminuirían a 1.8 m. Los periodos de olas disminuirían también de 22 segundos a 16 segundos en el norte y centro, y de 20 segundos a 14 segundos en el sur. Ver aviso especial [Ver aviso especial](#)






Figura 7. Sistema de Alta Presión del océano Pacífico Sur. Fuente: Datos: NCDC-NCEP/NOAA; Gráficos: DHN



DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION
DPTO OCEANOGRAFIA - DIV METEOROLOGIA
Serie de Tiempo - Fecha Condicion Inicial: 04 OCT 2017 06Z
Lat. 18 Sur Lon. 71.25 Oeste - Frente a Pto Ilo




Figura 8. Series de tiempo de la velocidad del viento (nudos), altura de olas (m), periodo de la ola (s) e índice de la potencia del oleaje (Kw/m) frente a las costas de Talara, Callao e Ilo, del 04-10-2017 al 11-10-2017 Fuente: Datos: modelo WWATCH III; Grafico: DHN