



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Viernes 12 Enero 2018

En el océano Pacífico ecuatorial occidental, la temperatura superficial del mar continuó presentando condiciones entre normales a ligeramente cálidas con temperaturas entre 26 °C y 29 °C, mientras que en la región central y oriental (155°W hacia el Este) la temperatura predominó por debajo de su valores normales, manifestando condiciones frías, a través de anomalías negativas hasta de 1.0 °C. En la región Niño 1+2, se registró temperaturas entre 19°C cerca a la costa norte del Perú y 24 °C en la parte oceánica, manifestando el incremento de la TSM y presencia de núcleos de anomalías positivas. Así mismo, por el lado del mar peruano la TSM mostró el incremento de sus valores en la zona oceánica, mientras que en la franja delgada de la costa aún se mantiene la presencia de anomalías negativas.




Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en el océano Pacífico. Los cuadros en azul son regiones Niño. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN





Figura 2. Izquierda: Temperatura (°C) superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Derecha: Anomalías de la temperatura superficial en el océano Pacífico Sur orient. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Viernes 12 Enero 2018

En el litoral peruano, continuaron predominando las condiciones frías, a través de las anomalías negativas de la temperatura superficial del mar, con mayor intensidad en el litoral norte. en el litoral centro las condiciones se mantienen ligeramente frías.

| Estación | Temperatura Superficial del Mar TSM, (°C)" | | | | | | | |
|--------------------|--|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | 08/01/2018 | | 09/01/2018 | | 10/01/2018 | | 11/01/2018 | |
| | TSM | ATSM | TSM | ATSM | TSM | ATSM | TSM | ATSM |
| Talara | 16.0 | -4.6 | 15.7 | -4.9 | 15.6 | -5.0 | 15.7 | -4.9 |
| Paita | 16.8 | -3.9 | 17.0 | -3.7 | 17.7 | -3.0 | 17.7 | -3.0 |
| I. Lobos de Afuera | 18.7 | -1.7 | -- | -- | 19.0 | -1.4 | 19.9 | -0.5 |
| Salaverry | 15.2 | -2.4 | 15.2 | -2.4 | 16.3 | -1.3 | 15.5 | -2.1 |
| Chimbote | 21.7 | -0.1 | 20.2 | -1.6 | 19.6 | -2.2 | 21.0 | -0.8 |
| Callao | 15.9 | -0.4 | 16.3 | 0.0 | 16.0 | -0.3 | 15.8 | -0.5 |
| San Juan | 15.1 | -0.6 | 15.4 | -0.3 | 15.5 | -0.2 | 15.1 | -0.6 |
| Mollendo | 16.3 | -0.9 | 16.0 | -1.2 | 16.4 | -0.8 | 16.2 | -1.0 |
| Ilo | 16.5 | -0.6 | 15.4 | -1.7 | 15.4 | -1.7 | 15.4 | -1.7 |

Figura 3. Cuadro de la temperatura superficial del mar y anomalías (°C) de las estaciones oceanográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.

En las series de tiempo diaria de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) frente a Paita, Chimbote, Callao e Ilo muestran de enero a octubre de 2015 condiciones superiores al evento El Niño 1982-1983 y similares al El Niño 1997-1998; sin embargo, desde octubre de 2015 la temperatura disminuyó alcanzando valores por debajo de las temperaturas de estos dos eventos, indicando condiciones cálidas de magnitud fuerte desde el mes de mayo 2015 hasta enero de 2016, según el Índice Costero El Niño (ICEN). Durante enero de 2017 se presentó un incremento rápido e importante de las temperaturas superficiales, principalmente en el litoral norte del Perú, debido al arribo de una onda cálida y al ingreso de Aguas Ecuatoriales, que se extendieron hacia el litoral centro y sur, en los meses de febrero y marzo, particularmente en la costa norte y centro. En los meses de abril y mayo la temperatura disminuyó gradualmente gracias a la influencia de la intensificación de los vientos frente a la costa peruana. En estos últimos meses desde agosto hasta diciembre la TSM viene disminuyendo gradualmente, hasta presentar el predominio de condiciones frías. Durante los primeros días de enero las condiciones frías continuaron con mayor intensidad en la costa norte, mientras que en la costa centro y sur muestra una tendencia hacia la normalización.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

NIVEL MEDIO DEL MAR

Viernes 12 Enero 2018

La DHN para el monitoreo del nivel del mar en tiempo real, cuenta actualmente con 11 estaciones mareográficas instaladas a lo largo del litoral peruano.

El nivel medio del mar, presentó valores por debajo de lo normal en el litoral norte, mientras que en el litoral centro y sur continua con niveles normales.

| Estación | Nivel Medio del Mar (NMM, m) | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 08/01/2018 | | 09/01/2018 | | 10/01/2018 | | 11/01/2018 | |
| | NMM | ANMM | NMM | ANMM | NMM | ANMM | NMM | ANMM |
| Talara | 0.82 | -0.08 | 0.80 | -0.10 | 0.78 | -0.12 | 0.78 | -0.12 |
| Paíta | 0.76 | -0.04 | -- | -- | 0.71 | -0.09 | 0.71 | -0.09 |
| I. Lobos de Afuera | 0.69 | -0.03 | 0.69 | -0.03 | 0.67 | -0.05 | 0.67 | -0.05 |
| Chimbote | 0.60 | -0.01 | 0.58 | -0.03 | 0.56 | -0.05 | 0.56 | -0.05 |
| Callao | 0.52 | -0.04 | 0.51 | -0.05 | 0.50 | -0.06 | 0.50 | -0.06 |
| Pisco | 0.44 | -0.03 | 0.46 | -0.01 | 0.42 | -0.05 | 0.42 | -0.05 |
| San Juan | 0.48 | +0.04 | 0.47 | +0.03 | 0.47 | +0.03 | 0.47 | +0.03 |
| Matarani | 0.51 | -0.03 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |

Figura 4. Cuadro de nivel medio del mar y anomalías (m) de las estaciones mareográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.






Figura 5. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Talara, Paíta, Isla Lobos y Chimbote del día 11-01-2018 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Los registros mareográficos provienen de las estaciones automáticas compuestas por un sensor de nivel tipo radar, marca Geónica modelo Datamar 2000C, de muestreo al segundo y registro promediado al minuto, con transmisión de información cada diez minutos vía red celular (GPRS), administrada por esta Dirección. A partir de estos registros, se pueden realizar investigaciones científicas como: las variaciones del nivel del mar durante Fenómenos como El Niño, La Niña, movimientos de la corteza terrestre y cambios climáticos; como agente modificador de la costa (transporte y sedimentación de material) y su influencia sobre el ecosistema de la zona intermareal, etc. Los mareógrafos también registran las manifestaciones de los seiches, bravezas de mar y tsunamis.






Figura 6. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Callao, Pisco, San Juan y Matarani, del día 11-01-2018 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Los registros mareográficos muestran características de condiciones normales.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

PRESIÓN Y OLAS

Viernes 12 Enero 2018

Para el 12 y 13 de enero el sistema de alta presión del Pacífico Sur, continuaría con una presión hasta 1028 hPa en su núcleo, pero alejado de la costa peruana, manteniendo los vientos débiles frente a la costa. Así mismo, el modelo WWATCH III mostraría frente a la costa de Perú vientos de 6 nudos a 8 nudos en el norte, 8 nudos a 12 nudos en el centro y vientos de 6 nudos a 10 nudos en el sur. Por otro lado, el mismo modelo WWACH III muestra alturas de las olas de 1.4 m a 1.7 m, Los periodos de las olas se encontrarían de 12 s hasta 14 s. [Ver aviso especial](#)






Figura 7. Sistema de Alta Presión del océano Pacífico Sur. Fuente: Datos: NCDC-NCEP/NOAA; Gráficos: DHN



DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION
 DPTO OCEANOGRAFIA – DIV METEOROLOGIA
 Serie de Tiempo – Fecha Condicion Inicial: 12 ENE 2018 06Z
 Lat. 18 Sur Lon. 71.25 Oeste – Frente a Pto Ilo




Figura 8. Series de tiempo de la velocidad del viento (nudos), altura de olas (m), periodo de la ola (s) e índice de la potencia del oleaje (Kw/m) frente a las costas de Talara, Callao e Ilo, del 12-01-2018 al 19-01-2018 Fuente: Datos: modelo WWATCH III; Grafico: DHN