



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Lunes 29 Enero 2018

En el océano Pacífico ecuatorial occidental las condiciones térmicas superficiales muestran condiciones entre normales a cálidas, mientras que en la región central se observó el proceso de normalización, hasta presentar en ciertos sectores anomalías positivas. En la región oriental, aun se mantiene el predominio de anomalías negativas. Por otro lado, en la región Niño 1+2, región adyacente a las costas de Ecuador y Perú, las condiciones térmicas muestran el incremento de la temperatura durante el transcurso de enero, presentando en la región valores de 20 °C a 25 °C, predominando condiciones entre normales a ligeramente cálido. En el mar peruano, la TSM se viene incrementando en los últimos días, registrando valores cerca a la costa de 20°C y presencia de isoterma de 24°C frente a la costa norte y sur. Las anomalías de la TSM mostraron, en la zona oceánica, presencia anomalías positivas, mientras que cerca a la costa central y sur, aun se observaron anomalías negativas.




Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en el océano Pacífico. Los cuadros en azul son regiones Niño. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN






Figura 2. Izquierda: Temperatura (°C) superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Derecha: Anomalías de la temperatura superficial en el océano Pacífico Sur orient. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Lunes 29 Enero 2018

En el litoral peruano la anomalía de la temperatura superficial del mar, aun predominó con anomalías negativas, presentando condiciones entre normales a frías.

Estación	Temperatura Superficial del Mar TSM, (°C)"							
	25/01/2018		26/01/2018		27/01/2018		28/01/2018	
	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM
Talara	17.7	-2.9	18.1	-2.5	17.3	-3.3	16.9	-3.7
Paita	20.2	-0.5	22.0	+1.3	20.9	+0.2	18.6	-2.1
I. Lobos de Afuera	19.6	-0.8	19.9	-0.5	20.0	-0.4	19.7	-0.7
Salaverry	16.8	-0.8	16.9	-0.7	16.7	-0.9	16.4	-1.2
Chimbote	20.7	-1.1	20.6	-1.2	21.4	-0.4	22.5	+0.7
Callao	16.4	+0.1	16.0	-0.3	16.0	-0.3	15.5	-0.8
San Juan	15.2	-0.5	15.0	-0.7	15.1	-0.6	15.1	-0.6
Mollendo	16.3	-0.9	15.9	-1.3	15.8	-1.4	15.8	-1.4
Ilo	14.6	-2.5	14.0	-3.1	14.1	-3.0	14.4	-2.7

Figura 3. Cuadro de la temperatura superficial del mar y anomalías (°C) de las estaciones oceanográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.

En las series de tiempo de temperatura superficial del mar (diaria), enero a octubre de 2015, de Paita, Chimbote, Callao e Ilo se muestran que las temperaturas fueron superiores al evento El Niño 1982-1983, y fueron similares al evento El Niño 1997-1998; después de este periodo la temperatura disminuyó hasta alcanzar valores por debajo de la temperatura de estos dos eventos, manifestándose como condiciones cálidas de magnitud fuerte (mayo 2015 - enero 2016), de acuerdo al Índice Costero El Niño (ICEN). Durante enero de 2017 se presentó un incremento rápido e importante de las temperaturas, principalmente en la litoral norte del Perú, debido al arribo de una onda cálida y al ingreso de Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES) hasta el litoral centro (enero - marzo); entre abril y mayo la temperatura disminuyó por influencia de la intensificación de los vientos frente a la costa peruana, manteniéndose en condiciones entre normal a ligeramente frías; sin embargo, después de agosto las anomalías de temperatura disminuyeron hasta predominan como condiciones frías. Durante el mes de enero, a lo largo de litoral centro y sur se mantiene aún con temperaturas por debajo de su normal, mientras que al extremo norte se observó el calentamiento de sus aguas.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

NIVEL MEDIO DEL MAR


Lunes 29 Enero 2018

La DHN para el monitoreo del nivel del mar en tiempo real, cuenta actualmente con 11 estaciones mareográficas instaladas a lo largo del litoral peruano.

El nivel medio del mar, en el litoral peruano, predominó con niveles normales.

Estación	Nivel Medio del Mar (NMM, m)							
	25/01/2018		26/01/2018		27/01/2018		28/01/2018	
	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM
Talara	0.86	-0.04	0.85	-0.05	0.84	-0.06	0.87	-0.03
Paita	0.80	0.00	0.79	-0.01	0.79	-0.01	0.77	-0.03
I. Lobos de Afuera	0.71	-0.01	0.70	-0.02	0.71	-0.01	0.73	+0.01
Chimbote	0.62	+0.01	0.60	-0.01	0.60	-0.01	0.62	+0.01
Callao	0.53	-0.03	0.56	0.00	0.54	-0.02	0.55	-0.01
Pisco	0.43	-0.04	0.43	-0.04	0.49	+0.02	0.49	+0.02
San Juan	0.43	-0.01	0.44	0.00	0.45	+0.01	0.51	+0.07
Matarani	0.50	-0.04	0.52	-0.02	0.52	-0.02	0.55	+0.01

Figura 4. Cuadro de nivel medio del mar y anomalías (m) de las estaciones mareográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.







Figura 5. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Talara, Paíta, Isla Lobos y Chimbote del día 28-01-2018 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Los registros mareográficos provienen de las estaciones automáticas compuestas por un sensor de nivel tipo radar, marca Geónica modelo Datamar 2000C, de muestreo al segundo y registro promediado al minuto, con transmisión de información cada diez minutos vía red celular (GPRS), administrada por esta Dirección. A partir de estos registros, se pueden realizar investigaciones científicas como: las variaciones del nivel del mar durante Fenómenos como El Niño, La Niña, movimientos de la corteza terrestre y cambios climáticos; como agente modificador de la costa (transporte y sedimentación de material) y su influencia sobre el ecosistema de la zona intermareal, etc. Los mareógrafos también registran las manifestaciones de los seiches, bravezas de mar y tsunamis.







Figura 6. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Callao, Pisco, San Juan y Matarani, del día 28-01-2018 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Los registros mareográficos aun muestra características de condiciones normales.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

PRESIÓN Y OLAS

Lunes 29 Enero 2018

Para el 29 y 30 de enero el sistema de alta presión del Pacífico Sur mantendría su núcleo de 1024 hPa, con una configuración zonal, generando vientos en la zona oceánica del Pacífico Sudeste. Así mismo, el modelo WWATCH III muestra frente a la costa peruana, vientos con velocidades de 8 nudos a 10 nudos en el norte, mientras que en el centro los vientos fluctuarían de 6 nudos a hasta 12 nudos. En la zona sur se observarían vientos entre 4 y 8 nudos. Por otro lado, el mismo modelo WWATCH III muestra frente al litoral peruano alturas de las olas de 1.6 m a 1.8 m, con periodos de las olas disminuirían de 18 s a 14 s.

[Ver aviso especial](#)






Figura 7. Sistema de Alta Presión del océano Pacífico Sur. Fuente: Datos: NCDC-NCEP/NOAA; Gráficos: DHN






Figura 8. Series de tiempo de la velocidad del viento (nudos), altura de olas (m), periodo de la ola (s) e índice de la potencia del oleaje (Kw/m) frente a las costas de Talara, Callao e Ilo, del 29-01-2018 al 05-02-2018 Fuente: Datos: modelo WWATCH III; Grafico: DHN