BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Jueves 8 Febrero 2018

En el océano Pacífico ecuatorial occidental las condiciones térmicas superficiales muestran condiciones normales, mientras que en la región central entre condiciones normales y ligeramente frías. En la región oriental, aun se mantiene el predominio de anomalias negativas. Por otro lado, en la región Niño 1+2, región adyacente a las costas de Ecuador y Perú, las condiciones térmicas muestran el incremento de la temperatura durante el transcurso de enero, presentando en la región valores de 20 °C a 26°C, predominando condiciones normales con algunos nucleos cálidos al norte de la región y nucleos fríos cerca de la costa norte del Perú. En el mar peruano, la TSM se viene incrementando en los últimos dias, registrando valores cerca a la costa de 20°C y presencia de isotermas de 24°C frente a la costa norte y sur. Las anomalias de la TSM mostraron, en la zona oceanica, presencia anomalias positivas, mientras que cerca a la costa peruana, aun se observaron anomalías negativas.





Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en el océano Pacífico. Los cuadros en azul son regiones Niño. Fuente: Datos: NCDCNCEP/NOAA; Gráficos: DHN






Figura 2. Izquierda: Temperatura (°C) superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Derecha: Anomalías de la temperatura superficial en el océano Pacífico Sur orient Fuente: Datos:NCDC-NCEP/NOAA; Gráficos:DHN.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

Jueves 8 Febrero 2018

En el litoral peruano las anomalías de la temperatura superficial del mar, aun predominaron con anomalias negativas a excepcion de Talara, San Juan e llo, donde presentó condiciones normales.

| Estación | Temperatura Superficial del Mar TSM, (°C)" | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------|------------|------|------------|------|------------|------|--|--|--|
| | 04/02/2018 | | 05/02/2018 | | 06/02/2018 | | 07/02/2018 | | | | |
| | TSM | ATSM | TSM | ATSM | TSM | ATSM | TSM | ATSM | | | |
| Talara | 22.9 | 0.0 | 24.3 | +1.4 | 23.3 | +0.4 | 23.3 | +0.4 | | | |
| Paita | 21.3 | -2.1 | 21.6 | -1.8 | 22.7 | -0.7 | 22.7 | -0.7 | | | |
| I. Lobos de Afuera | 18.6 | -3.4 | 18.4 | -3.6 | 18.6 | -3.4 | | | | | |
| Salaverry | 15.3 | -3.6 | 16.2 | -2.7 | 16.7 | -2.2 | 17.3 | -1.6 | | | |
| Chimbote | 19.9 | -2.9 | 21.0 | -1.8 | 21.1 | -1.7 | 19.5 | -3.3 | | | |
| Callao | 15.2 | -1.9 | 15.2 | -1.9 | 15.3 | -1.8 | 15.6 | -1.5 | | | |
| San Juan | 15.1 | -0.8 | 14.8 | -1.1 | 15.0 | -0.9 | 15.5 | -0.4 | | | |
| Mollendo | 15.1 | -2.0 | 15.5 | -1.6 | 15.4 | -1.7 | 16.0 | -1.1 | | | |
| llo | 17.1 | +0.2 | 17.3 | +0.4 | 17.0 | +0.1 | 16.5 | -0.4 | | | |

Figura 3.Cuadro de la temperatura superficial del mar y anomalías (°C) de las estaciones oceanográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanográfia DHN.

En las series de tiempo de temperatura superficial del mar (diaria), enero a octubre de 2015, de Paita, Chimbote, Callao e llo se muestran que las temperaturas fueron superiores al evento El Niño 1982-1983, y fueron similares al evento El Niño 1997-1998; después de este periodo la temperatura disminuyó hasta alcanzar valores por debajo de la temperatura de estos dos eventos, manifestándose como condiciones cálidas de magnitud fuerte (mayo 2015 - enero 2016), de acuerdo al Índice Costero El Niño (ICEN). Durante enero de 2017 se presentó un incremento rápido e importante de las temperaturas, principalmente en la litoral norte del Perú, debido al arribo de una onda cálida y al ingreso de Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES) hasta el litoral centro (enero - marzo); entre abril y mayo la temperatura disminuyó por influencia de la intensificación de los vientos frente a la costa peruana, manteniéndose en condiciones entre normal a ligeramente frías; sin embargo, después de agosto las anomalías de temperatura disminuyeron hasta predominan como condiciones frías. Durante el mes de enero, a lo largo del litoral se mantiene aún con temperaturas por debajo de su normal, mientras que al extremo norte, en la zona oceánica, se observó el calentamiento de sus aguas.


Jueves 8 Febrero 2018


La DHN para el monitoreo del nivel del mar en tiempo real, cuenta actualmente con 11 estaciones mareográficas instaladas a lo largo del litoral peruano.

El nivel medio del mar, en el litoral peruano, fluctuó dentro de los niveles normales.

| Estación | Nivel Medio del Mar (NMM, m) | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|--|--|
| | 04/02/2018 | | 05/02/2018 | | 06/02/2018 | | 07/02/2018 | | | |
| | NMM | ANMM | NMM | ANMM | NMM | ANMM | NMM | ANMM | | |
| Talara | 0.97 | +0.05 | 0.93 | +0.01 | 0.94 | +0.02 | 0.95 | +0.03 | | |
| Paita | 0.82 | -0.01 | 0.80 | -0.03 | 0.78 | -0.05 | 0.79 | -0.04 | | |
| I. Lobos de Afuera | 0.76 | +0.01 | 0.72 | -0.03 | 0.72 | -0.03 | 0.74 | -0.01 | | |
| Chimbote | 0.65 | +0.03 | 0.61 | -0.01 | 0.61 | -0.01 | 0.60 | -0.02 | | |
| Callao | 0.57 | -0.01 | 0.53 | -0.05 | 0.53 | -0.05 | 0.53 | -0.05 | | |
| Pisco | 0.48 | -0.01 | 0.45 | -0.04 | 0.46 | -0.03 | 0.47 | -0.02 | | |
| San Juan | 0.51 | +0.05 | 0.49 | +0.03 | 0.51 | +0.05 | 0.50 | +0.04 | | |
| Matarani | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.58 | +0.02 | 0.60 | +0.04 | | |

Figura 4. Cuadro de nivel medio del mar y anomalías (m) de las estaciones mareográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.








Figura 5. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Talara, Paita, Isla Lobos y Chimbote del día 07-02-2018 Fuente: División de Oceanográfia DHN.

Los registros mareográficos provienen de las estaciones automáticas compuestas por un sensor de nivel tipo radar, marca Geónica modelo Datamar 2000C, de muestreo al segundo y registro promediado al minuto, con transmisión de información cada diez minutos vía red celular (GPRS), administrada por esta Dirección. A partir de estos registros, se pueden realizar investigaciones científicas como: las variaciones del nivel del mar durante Fenómenos como El Niño, La Niña, movimientos de la corteza terrestre y cambios climáticos; como agente modificador de la costa (transporte y sedimentación de material) y su influencia sobre el ecosistema de la zona intermareal, etc. Los mareógrafos también registran las manifestaciones de los seiches, bravezas de mar y tsunamis.




Figura 6. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Callao, Pisco, San Juan y Matarani, del día 07-02-2018 Fuente: División de Oceanográfia DHN.


Los registros mareográficos aun muestra características de condiciones normales.

integra y complementa los demás componentes de este comité.

PRESIÓN Y OLAS

Jueves 8 Febrero 2018

Para el 8 y 9 de febrero el sistema de alta presión del Pacífico Sur continuaria con una presión hasta 1020 hPa en su núcleo, pero aún alejado de la costa de Sudamerica, generando incremento de los vientos en el oceano Pacífico Sur. Así mismo, el modelo WWATCH III muestra frente a la costa Norte y Sur, la continuidad de los vientos con velocidades menores de 11 nudos, mientras que frente a la costa centro vientos mas debiles, con velocidades menores de 8 nudos. Por otro lado, el mismo modelo WWACH III muestra frente al litoral peruano el incremento de las alturas de las olas de 1.4 m a 1.8 m, con periodos de las olas que disminuirian de 18 s a 14 s. Ver aviso especial






Figura 7. Sistema de Alta Presión del océano Pacífico Sur. Fuente: Datos: NCDC-NCEP/NOAA; Gráficos: DHN

DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION
DPTO OCEANGGRAFIA — DIV METEOROLOGIA

Serie de Tiempo — Fecha Condicion Inicial: 06 FEB 2018 12Z
Lat. 12 Sur Lon. 77.5 Oeste — Frente a Pto Callao

Velocidad del viento (nudas)

15

Altura de las alas (mts)

20

I.8

I.6

Períada de ala pico (seg)

Indice de Potencia del Oleaje (Kw/m)

60

40

Indice de Potencia del Oleaje (Kw/m)

60

TEB SEB 9FEB 10FEB 11FEB 12FEB 13FEB 14FE

Piente: World Wowshich — NOEP/NONA

INTENSIDAD DEL OLEAJE >>> +++ Ligero ++++ Moderado +++ Fuerte ++++ Muster's ++- Muster's +-- Muster's ++- Must

DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION DPTO OCEANOGRAFIA — DIV METEOROLOGIA

Serie de Tiempo - Fecha Condicion Inicial: 06 FEB 2018 12Z Lat. 18 Sur Lon. 71.25 Oeste - Frente a Pto Ila




Figura 8. Series de tiempo de la velocidad del viento (nudos), altura de olas (m), periodo de la ola (s) e índice de la potencia del oleaje (Kw/m) frente a las costas de Talara, Callao e Ilo, del 08-02-2018 al 15-02-2018 Fuente: Datos: modelo WWATCH III; Grafico: DHN