BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Viernes 9 Noviembre 2018

En el Pacífico ecuatorial la temperatura superficial continúa por encima de lo normal, con valores de 29 °C a 30 °C en la región occidental, de 26 °C a 28 °C en el central, y de 23 °C a 26 °C en el oriental; manifestándose condiciones cálidas en todas la franja ecuatorial a través de anomalías positivas del orden de +1 °C en la región occidental, de +1 °C a +2 °C en la región central y de +1 °C a +3 °C en la región oriental, sólo en esta última a la altura de los 100°O se manifiesta unos pequeños núcleos de anomalías negativas. En la región adyacente a las costas de Sudamérica, región Niño 1+2, la temperatura es variable, marcándose dos áreas, una al norte de los 04° S con gradiente térmico hacia el norte con temperaturas de 22 °C a 25°C, mientras en el sur de la misma latitud con gradiente hacia el oeste con temperaturas de 19 °C a 22 °C. Estas temperaturas manifiestan dos condiciones, por un lado condiciones de normal a ligeramente cálidas con anomalías hasta de +1 °C, y por otro lado condiciones cálidas frente a a las costas de Ecuador y norte de Perú con anomalías hasta de +3.5 °C. Por otro lado, frentes a las costas de Perú, len la zona norte se manifiesta la continuidad del calentamiento con anomalías hasta +3.5 °C en el norte, hasta +1rC en el centro y +0.5°C en el sur.





Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en el océano Pacífico. Los cuadros en azul son regiones Niño. Fuente: Datos: NCDCNCEP/NOAA; Gráficos: DHN






Figura 2. Izquierda: Temperatura (°C) superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Derecha: Anomalías de la temperatura superficial en el océano Pacífico Sur orient Fuente: Datos:NCDC-NCEP/NOAA; Gráficos:DHN.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

Viernes 9 Noviembre 2018

En el litoral de Perú la temperatura muestra condiciones cálidas de norte a sur, con mayores anomalías en el norte. Sólo frente a Chimbote las condiciones se presentan normal.

Estación	Temperatura Superficial del Mar TSM, (°C)"									
	05/11/2018		06/11/2018		07/11/2018		08/11/2018			
	TSM	ATSM	тѕм	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM		
Talara	20.9	+2.2	21.1	+2.4	21.0	+2.3	19.5	+0.8		
Paita	21.6	+3.7	21.7	+3.8	20.7	+2.8	20.7	+2.8		
I. Lobos de Afuera	19.0	+0.8	19.1	+0.9			19.3	+1.1		
Salaverry	16.3	+0.2	16.5	+0.4	16.4	+0.3	16.4	+0.3		
Chimbote	19.6	0.0	19.8	+0.2	19.1	-0.5	19.5	-0.1		
Callao	16.0	+0.9	16.6	+1.5	16.3	+1.2	16.5	+1.4		
San Juan	14.3	+0.3	14.5	+0.5	14.5	+0.5	14.6	+0.6		
Mollendo	17.3	+1.5	18.7	+2.9	18.0	+2.2	17.2	+1.4		
llo	17.9	+2.4	18.5	+3.0	17.9	+2.4	16.3	+0.8		

Figura 3. Cuadro de la temperatura superficial del mar y anomalías (°C) de las estaciones oceanográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanográfia DHN.

En las series de tiempo de temperatura superficial del mar diaria, se muestra que de enero a octubre de 2015 (Paita, Chimbote, Callao e Ilo) temperaturas superiores a El Niño 1982-1983, y similares a El Niño 1997-1998; después de este periodo la temperatura disminuyó hasta alcanzar valores por debajo de la temperatura de estos dos eventos mencionados, manifestándose como condiciones cálidas de magnitud fuerte, de acuerdo al Índice Costero El Niño (ICEN). En enero de 2017 se presentó un incremento rápido e importante de las temperaturas, principalmente en la litoral norte de Perú, debido al arribo de una onda cálida y al ingreso de Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES) hasta el litoral centro (enero - marzo); entre abril y mayo la temperatura disminuyó por influencia de la intensificación de los vientos frente a la costa peruana, manteniéndose en condiciones entre normal a ligeramente frías; sin embargo, después de agosto las anomalías de temperatura disminuyeron hasta predominar como condiciones frías. En enero de 2018, en todo el litoral la temperatura se mantuvo por debajo de sus valores normales: sin embargo, en febrero en el norte (Talara y Paita) las condiciones se presentaron adversas, a través de anomalías positivas diarias; mientras que en el centro y sur se mantuvieron frías, hasta recuperarse en el mes de mayo. En junio estas anomalías disminuyeron respecto al mes anterior, en particular con mayor intensidad en el norte y parte del litoral centro, mientras que al sur del Callao predominaron temperaturas casi normales. En julio la temperatura en todo el litoral presentó valores cercanos a lo normal, para luego entre agosto y setiembre aumentar hasta manifestar condiciones ligeramente cálidas, con mayor intensidad en el litoral norte. En este último mes de octubre este calentamiento del norte disminuyó.


Viernes 9 Noviembre 2018


La DHN para el monitoreo del nivel del mar en tiempo real, cuenta actualmente con 11 estaciones mareográficas instaladas a lo largo del litoral peruano.

El nivel del mar en todo el litoral continúa por encima de sus niveles normales, con mayores anomalías en el norte y sur. En el norte en promedio de +14 cm, en el centro de +9 cm y en sur + 15 cm.

Estación	Nivel Medio del Mar (NMM, m)										
	05/11/2018		06/11/20	06/11/2018		07/11/2018		08/11/2018			
	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM			
Talara	0.98	+0.13	0.99	+0.14	0.99	+0.14	0.99	+0.14			
Paita	0.88	+0.12	0.91	+0.15	0.92	+0.16	0.90	+0.14			
I. Lobos de Afuera	0.81	+0.11	0.85	+0.15	0.85	+0.15	0.82	+0.12			
Chimbote	0.69	+0.12	0.66	+0.09	0.65	+0.08	0.66	+0.09			
Callao	0.60	+0.08	0.61	+0.09	0.58	+0.06	0.58	+0.06			
Pisco	0.59	+0.16	0.57	+0.14	0.56	+0.13	0.52	+0.09			
San Juan	0.54	+0.15	0.59	+0.20	0.55	+0.16	0.51	+0.12			
Matarani	0.63	+0.14	0.65	+0.16	0.68	+0.19	0.67	+0.18			

Figura 4. Cuadro de nivel medio del mar y anomalías (m) de las estaciones mareográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.








Figura 5. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Talara, Paita, Isla Lobos y Chimbote del día 08-11-2018 Fuente: División de Oceanográfia DHN.

Los registros mareográficos provienen de las estaciones automáticas compuestas por un sensor de nivel tipo radar, marca Geónica modelo Datamar 2000C, de muestreo al segundo y registro promediado al minuto, con transmisión de información cada diez minutos vía red celular (GPRS), administrada por esta Dirección. A partir de estos registros, se pueden realizar investigaciones científicas como: las variaciones del nivel del mar durante Fenómenos como El Niño, La Niña, movimientos de la corteza terrestre y cambios climáticos; como agente modificador de la costa (transporte y sedimentación de material) y su influencia sobre el ecosistema de la zona intermareal, etc. Los mareógrafos también registran las manifestaciones de los seiches, bravezas de mar y tsunamis.




Figura 6. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Callao, Pisco, San Juan y Matarani, del día 08-11-2018 Fuente: División de Oceanográfia DHN.


Los registros del Nivel del mar del litoral peruano muestran características de condiciones de oleajes de moderada intensidad con tendencia a disminuir gradualmente.

integra y complementa los demás componentes de este comité.

PRESIÓN Y OLAS

Viernes 9 Noviembre 2018

Para el 09 y 10 de noviembre el sistema de alta presión se encontraría bifurcado, con dos núcleos aún débiles, asimismo un sistema de baja presión con menor cobertura espacial e intensidad pero cerca de las costas del sur de Chile. Esto mantendría presiones y vientos débiles frente a las costas de Perú. A otra escala, el modelo WWATCH III muestra en el litoral peruano vientos del Sur (S) que continuarían disminuyendo, en particular en frente a la costa norte y centro, Por otro lado, el mismo modelo WWACH III pronostica el incremento rápido de las alturas de olas con corta duración, disminuyendo nuevamente en las últimos horas del sábado, con periodos que disminuirían en estos dos días de 17 segundos a 15 segundos. Ver aviso especial






Figura 7. Sistema de Alta Presión del océano Pacífico Sur. Fuente: Datos: NCDC-NCEP/NOAA; Gráficos: DHN

DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION
DPTO OCEANOGRAFIA — DIV METEOROLOGIA

Serie de Tiempo — Fecha Condicion Inicial: 09 NOV 2018 06Z
Lat. 12 Sur Lon. 77.5 Oeste — Frente a Pto Callao

Velocidad del viento (nudos)

Altura de las alas (mts)

Altura de las alas (mts)

Período de ola pico (seg)

Indice de Potencia del Oleaje (Kw/m)

Indice de Potencia del Oleaje (Kw/m)

Tinnov 11Nov 12Nov 13Nov 14Nov 15Nov 15Nov 16PNova

INTENSIDAD DEL OLEAJE >>>

DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION DPTO OCEANOGRAFIA — DIV METEOROLOGIA

Serie de Tiempo - Fecha Condicion Inicial: 09 NOV 2018 06Z Lat. 18 Sur Lon. 71.25 Oeste - Frente a Pto Ila




Figura 8. Series de tiempo de la velocidad del viento (nudos), altura de olas (m), periodo de la ola (s) e índice de la potencia del oleaje (Kw/m) frente a las costas de Talara, Callao e llo, del 09-11-2018 al 16-11-2018 Fuente: Datos: modelo WWATCH III; Grafico: DHN