



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Domingo 9 Diciembre 2018

En el Pacífico ecuatorial la temperatura superficial continúa por encima de lo normal, con valores de 29 °C a 30 °C en la región occidental, de 26 °C a 28 °C en el central, y de 23 °C a 26 °C en el oriental; manifestándose condiciones cálidas en todas la franja ecuatorial a través de anomalías positivas del orden de +1 °C en la región occidental, de +1 °C a +2 °C en la región central y de +1 °C a +3 °C en la región oriental. En la región adyacente a las costas de Sudamérica, región Niño 1+2, la temperatura se mantiene por encima de lo normal, con temperaturas de 21°C a 24°C en la zona norte de la región. Estas temperaturas manifiestan condiciones cálidas en toda el área, con anomalías hasta de 3.5°C. Por otro lado, frentes a las costas de Perú, en la zona norte se manifiesta la continuidad del calentamiento con anomalías hasta +3.5°C en el norte, hasta +1°C en el centro y +0.5°C en el sur.




Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en el océano Pacífico. Los cuadros en azul son regiones Niño. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN





Figura 2. Izquierda: Temperatura (°C) superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Derecha: Anomalías de la temperatura superficial en el océano Pacífico Sur orient. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Domingo 9 Diciembre 2018

En el litoral de peruano la temperatura continua mostrando condiciones cálidas, a través de sus anomalías positivas, a excepción de San Juan donde se manifiestan condiciones normales.

Estación	Temperatura Superficial del Mar TSM, (°C)"							
	05/12/2018		06/12/2018		07/12/2018		08/12/2018	
	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM
Talara	20.3	+1.0	20.2	+0.9	20.4	+1.1	20.2	+0.9
Paita	20.9	+2.2	21.4	+2.7	21.4	+2.7	21.0	+2.3
I. Lobos de Afuera	20.6	+1.3	20.6	+1.3	20.7	+1.4	20.2	+0.9
Salaverry	18.2	+1.5	18.3	+1.6	18.2	+1.5	18.1	+1.4
Chimbote	21.7	+1.0	21.7	+1.0	21.5	+0.8	21.5	+0.8
Callao	17.1	+1.4	17.1	+1.4	17.2	+1.5	17.1	+1.4
San Juan	14.9	+0.2	15.9	+1.2	14.8	+0.1	14.9	+0.2
Mollendo	17.5	+0.9	17.5	+0.9	17.8	+1.2	17.5	+0.9
Ilo	17.6	+1.3	18.5	+2.2	17.9	+1.6	17.7	+1.4

Figura 3. Cuadro de la temperatura superficial del mar y anomalías (°C) de las estaciones oceanográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.

En las series de tiempo de temperatura superficial del mar diaria, se muestra que de enero a octubre de 2015 (Paita, Chimbote, Callao e Ilo) temperaturas superiores a El Niño 1982-1983, y similares a El Niño 1997-1998; después de este periodo la temperatura disminuyó hasta alcanzar valores por debajo de la temperatura de estos dos eventos mencionados, manifestándose como condiciones cálidas de magnitud fuerte, de acuerdo al Índice Costero El Niño (ICEN). En enero de 2017 se presentó un incremento rápido e importante de las temperaturas, principalmente en el litoral norte de Perú, debido al arribo de una onda cálida y al ingreso de Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES) hasta el litoral centro (enero - marzo); entre abril y mayo la temperatura disminuyó por influencia de la intensificación de los vientos frente a la costa peruana, manteniéndose en condiciones entre normal a ligeramente frías; sin embargo, después de agosto las anomalías de temperatura disminuyeron hasta predominar como condiciones frías. En enero de 2018, en todo el litoral la temperatura se mantuvo por debajo de sus valores normales: sin embargo, en febrero en el norte (Talara y Paita) las condiciones se presentaron adversas, a través de anomalías positivas diarias; mientras que en el centro y sur se mantuvieron frías, hasta recuperarse en el mes de mayo. En junio estas anomalías disminuyeron respecto al mes anterior, en particular con mayor intensidad en el norte y parte del litoral centro, mientras que al sur del Callao predominaron temperaturas casi normales. En julio la temperatura en todo el litoral presentó valores cercanos a lo normal, para luego entre agosto y setiembre aumentar hasta manifestar condiciones ligeramente cálidas, con mayor intensidad en el litoral norte. A fines de octubre y noviembre se incrementaron los valores térmicos, principalmente en la costa norte y extremo sur.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

NIVEL MEDIO DEL MAR



Domingo 9 Diciembre 2018

La DHN para el monitoreo del nivel del mar en tiempo real, cuenta actualmente con 11 estaciones mareográficas instaladas a lo largo del litoral peruano.

El nivel del mar en todo el litoral peruano, en los últimos días empezó a mostrar una disminución de sus valores, presentando en el norte anomalías de +3 cm.

Estación	Nivel Medio del Mar (NMM, m)							
	05/12/2018		06/12/2018		07/12/2018		08/12/2018	
	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM
Talara	0.91	+0.04	0.90	+0.03	0.92	+0.05	0.92	+0.05
Paíta	0.83	+0.05	0.80	+0.02	0.79	+0.01	0.79	+0.01
I. Lobos de Afuera	0.77	+0.05	0.76	+0.04	0.74	+0.02	0.20	-0.52
Chimbote	0.69	+0.10	0.69	+0.10	0.67	+0.08	0.67	+0.08
Callao	0.52	-0.02	0.49	-0.05	0.46	-0.08	0.46	-0.08
Pisco	0.41	-0.04	0.40	-0.05	0.34	-0.11	0.34	-0.11
San Juan	0.42	+0.01	0.45	+0.04	0.40	-0.01	0.40	-0.01
Matarani	0.58	+0.07	0.57	+0.06	0.54	+0.03	0.54	+0.03

Figura 4. Cuadro de nivel medio del mar y anomalías (m) de las estaciones mareográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.






Figura 5. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Talara, Paíta, Isla Lobos y Chimbote del día 08-12-2018 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Los registros mareográficos provienen de las estaciones automáticas compuestas por un sensor de nivel tipo radar, marca Geónica modelo Datamar 2000C, de muestreo al segundo y registro promediado al minuto, con transmisión de información cada diez minutos vía red celular (GPRS), administrada por esta Dirección. A partir de estos registros, se pueden realizar investigaciones científicas como: las variaciones del nivel del mar durante Fenómenos como El Niño, La Niña, movimientos de la corteza terrestre y cambios climáticos; como agente modificador de la costa (transporte y sedimentación de material) y su influencia sobre el ecosistema de la zona intermareal, etc. Los mareógrafos también registran las manifestaciones de los seiches, bravezas de mar y tsunamis.






Figura 6. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Callao, Pisco, San Juan y Matarani, del día 08-12-2018 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Los registros del Nivel del mar del litoral peruano muestran características de condiciones de oleajes de ligera intensidad.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

PRESIÓN Y OLAS

Domingo 9 Diciembre 2018

Para el 9 y 10 de diciembre el sistema de alta presión presentaría una presión de 1020 hPa, generando la disminución de los vientos en el océano Pacífico suroriental, al igual que frente a las costas de Perú. A otra escala, el modelo WWATCH III muestra en el litoral peruano vientos del Sur (S) con magnitudes de 10 nudos a 14 nudos en el norte, de 9 nudos a 12 nudos en el centro y de 6 nudos a 10 nudos. Por otro lado, el mismo modelo WWACH III pronostica la disminución de las alturas de olas de 1.2 m a 1.6 m asociados a periodos 12 s a 14 s segundos. [Ver aviso especial](#)






Figura 7. Sistema de Alta Presión del océano Pacífico Sur. Fuente: Datos: NCDC-NCEP/NOAA; Gráficos: DHN



DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION
 DPTO OCEANOGRAFIA – DIV METEOROLOGIA
 Serie de Tiempo – Fecha Condicion Inicial: 09 DIC 2018 18Z
 Lat. 18 Sur Lon. 71.25 Oeste – Frente a Pto Ilo




Figura 8. Series de tiempo de la velocidad del viento (nudos), altura de olas (m), periodo de la ola (s) e índice de la potencia del oleaje (Kw/m) frente a las costas de Talara, Callao e Ilo, del 09-12-2018 al 16-12-2018 Fuente: Datos: modelo WWATCH III; Grafico: DHN