Dirección de Hidrografía y Navegación
Departamento de Oceanografía

BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Jueves 6 Febrero 2020

El Pacífico ecuatorial, en la región occidental la temperaturas se mantienen entre 29°C y 30°C, en la región central entre 25°C y 29°C y en la región oriental entre 23°C y 27°C, observándose una disminución de las condiciones cálidas sobre el Pacífico ecuatorial central y occidental; sin embargo, en la región oriental se continúan incrementando los núcleos de anomalía positiva. Entre los 90°W y 80°W se presentó la mayor anomalía térmica, con hasta +4°C. En la región adyacente a la costa sudamericana (región Niño 1+2), la temperatura muestra valores entre 24°C cerca de la costa de Perú y 27°C al norte de 04°S. Estos valores de temperatura disminuyeron las anomalías positivas frente a la costa peruana; debido a la formación de núcleos negativos costeros de anomalía de temperatura. Los núcleos cálidos oceánicos en la regiones centro-norte y frente a Ilo se debilitaron en intensidad. Por otro lado, a nivel oceánico se observa un intenso núcleo cálido entre los 2°N y 5°S con valores de hasta +4°C. En el mar de Perú la temperatura presenta núcleos negativos replegados a la costa frente al litoral centro y sur, registrándose una anomalía promedio de -2°C. El núcleo cálido oceánico frente a Ilo se debilitó en intensidad y extensión. Los núcleos negativos mas intenso se observan frente a Salinas y Trujillo con un valor de hasta -4°C .



Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en el océano Pacífico. Los cuadros en azul son regiones Niño. Fuente: Datos: NCDCNCEP/NOAA; Gráficos: DHN





Figura 2. Izquierda: Temperatura (°C) superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Derecha: Anomalías de la temperatura superficial en el océano Pacífico Sur orient Fuente: Datos:NCDC-NCEP/NOAA; Gráficos:DHN.

Jueves 6 Febrero 2020

Las temperaturas se mantuvieron semejantes a los días anteriores frente a la costa centro y sur del Perú; sin embargo, en la costa norte se vio un calentamiento frente a Paita. Se registraron condiciones cálidas frente a Paita, Callao y Mollendo, con anomalías de hasta +1.4°C. Por otro lado, frente a Talara se intensifica la condición fría con un valor de -3.3°C.

Estación	Temperatura Superficial del Mar TSM, (°C)"							
	02/02/2020		03/02/2020		04/02/2020		05/02/2020	
	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM
Talara	24.2	+1.3	21.8	-1.1	20.7	-2.2	19.6	-3.3
Paita	24.5	+1.1	23.9	+0.5	24.2	+0.8	24.6	+1.2
I. Lobos de Afuera	25.4	+5.0	--	--	--	--	--	--
Salaverry	21.0	+2.1	18.7	-0.2	18.7	-0.2	19.0	+0.1
Chimbote	23.2	+0.4	22.9	+0.1	22.7	-0.1	22.4	-0.4
Callao	18.3	+1.2	18.4	+1.3	18.6	+1.5	18.5	+1.4
San Juan	17.0	+1.3	16.4	+0.5	16.7	+0.8	16.5	+0.6
Mollendo	18.6	+1.5	18.4	+1.3	19.4	+2.3	18.5	+1.4
Ilo	18.7	+1.8	17.4	+0.5	16.7	-0.2	15.8	-1.1

Figura 3. Cuadro de la temperatura superficial del mar y anomalías (°C) de las estaciones oceanográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.

En la serie temporal de la temperatura superficial del mar en el litoral de Perú muestra un verano cálido de 2019 en el norte, particularmente a partir de de febrero; mientras que, frente a el litoral centro y sur las condiciones se presentaron frías hasta el mes de mayo. A partir de junio disminuyeron las anomalías y se presentaron valores dentro del rango normal para los valores de temperatura. El aumento de la anomalía de temperatura durante el verano de 2019 se debió al efecto de la onda Kelvin cálida, pero que luego se vio atenuada y debilitada por la llegada de una onda Kelvin fría y la estacionalidad. En los meses de agosto y setiembre, las condiciones fueron cercanas a sus valores normales, mientras que para octubre y noviembre las condiciones cambiaron en el norte debido al ingreso de aguas cálidas y arribo de una onda Kelvin cálida. Finalmente, en diciembre se presentaron anomalías positivas en la costa norte y centro como producto de la ultima onda Kelvin que arribó y anomalías negativas frente a la costa sur. En el transcurso de enero del 2020, el efecto de una onda Kelvin cálida, que llego los primeros días del mes, se vio disminuido debido a otra onda Kelvin fría que paso los días siguientes. Esta onda fría mantuvo anomalías negativas frente a todo el litoral del Perú.

Dirección de Hidrografía y Navegación
Departamento de Oceanografía

BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

NIVEL MEDIO DEL MAR

Jueves 6 Febrero 2020

La DHN para el monitoreo del nivel del mar en tiempo real, cuenta actualmente con 11 estaciones mareográficas instaladas a lo largo del litoral peruano.

El nivel del mar frente a la costa del Perú mantuvo sus anomalías frente al litoral norte, registrando valores dentro del rango normal. Se observa una condición por debajo de lo normal frente al Callao con hasta -6cm de anomalía. Únicamente frente a la costa de Chimbote se registran anomalías positivas de nivel con +5cm.

Estación	Nivel Medio del Mar (NMM, m)							
	02/02/2020		03/02/2020		04/02/2020		05/02/2020	
	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM
Talara	0.93	+0.01	0.92	0.00	0.90	-0.02	0.93	+0.01
Paita	0.85	+0.02	0.85	+0.02	0.82	-0.01	0.84	+0.01
I. Lobos de Afuera	0.77	+0.05	0.79	+0.04	0.74	-0.01	0.75	0.00
Chimbote	0.65	+0.03	0.66	+0.04	0.67	+0.05	0.67	+0.05
Callao	0.49	-0.09	0.53	-0.05	0.52	-0.06	0.52	-0.06
Pisco	0.42	-0.07	0.42	-0.07	0.45	-0.04	0.49	0.00
San Juan	0.44	0.00	--	--	--	--	--	--
Matarani	--	--	--	--	--	--	--	--

Figura 4. Cuadro de nivel medio del mar y anomalías (m) de las estaciones mareográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.







Figura 5. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Talara, Paita, Isla Lobos y Chimbote del día 05-02-2020 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Los registros mareográficos provienen de las estaciones automáticas compuestas por un sensor de nivel tipo radar, marca Geónica modelo Datamar 2000C, de muestreo al segundo y registro promediado al minuto, con transmisión de información cada diez minutos vía red celular (GPRS), administrada por esta Dirección. A partir de estos registros, se pueden realizar investigaciones científicas como: las variaciones del nivel del mar durante Fenómenos como El Niño, La Niña, movimientos de la corteza terrestre y cambios climáticos; como agente modificador de la costa (transporte y sedimentación de material) y su influencia sobre el ecosistema de la zona intermareal, etc. Los mareógrafos también registran las manifestaciones de los seiches, bravezas de mar y tsunamis.



Figura 6. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Callao, Pisco, San Juan y Matarani, del día 05-02-2020 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Dirección de Hidrografía y Navegación
Departamento de Oceanografía

BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

PRESIÓN Y OLAS

Jueves 6 Febrero 2020

Para el 7 de febrero el sistema de alta presión se mantendría debilitado con presiones máximas de 1020 hPa; debido a su intensidad menor de lo normal y su posición mas al este de lo normal, se generaría un campo de viento con velocidades bajas frente de la costa norte del Perú. El modelo WWATCH III para el 7 de febrero muestra frente de la costa norte de Perú vientos predominantes del sudeste, con magnitudes de 10 nudos a 11 nudos frente a la costa norte, en el centro de 8 nudos a 10 nudos y frente a la costa sur (Ilo) fluctuación de 10 nudos a 5 nudos. El mismo modelo, muestra frente a la costa del Perú un decaimiento de la altura de las olas de 2.2 m a 1.8 m, asociado a periodos de 13 s a 16 s. Ver aviso especial



Figura 7. Sistema de Alta Presión del océano Pacífico Sur. Fuente: Datos: NCDC-NCEP/NOAA; Gráficos: DHN







Figura 8. Series de tiempo de la velocidad del viento (nudos), altura de olas (m), periodo de la ola (s) e índice de la potencia del oleaje (Kw/m) frente a las costas de Talara, Callao e Ilo, del 06-02-2020 al 13-02-2020 Fuente: Datos: modelo WWATCH III; Grafico: DHN