



## BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

### TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Lunes 3 Mayo 2021

El Pacífico ecuatorial, en la región occidental la temperaturas se mantienen entre 28°C y 29°C, en la región central entre 26°C y 28°C y en la región oriental entre 19°C y 28°C, continuándose una normalización de las condiciones térmicas en el Pacífico central y occidental; mientras que, en la región oriental, se desarrolla un núcleo térmico positivo y alcanza una anomalía de hasta +3°C al norte de el ecuador. Este núcleo cruza entre los 90°W y 80°W, con un valor máximo de +3°C. Por otro lado, pequeños núcleos negativos se desarrollan entre los 125°W y 115°W, mostrando valores ligeramente por debajo de los -0.5°C. En la región adyacente a la costa sudamericana (región Niño 1+2), la temperatura muestra valores entre 19°C cerca de la costa de Perú y 23°C al norte de 04°S. Estos valores de temperatura desarrollan anomalías positivas que continúan intensificándose al norte de los 4°S con un valor promedio de +1.5°C; sin embargo, al sur de los 6°S se mantienen los núcleos negativos de -1.5°C, promediándose la región Niño 1+2 con condiciones dentro de lo normal a ligeramente cálida. En el mar de Perú la temperatura presentó valores entre 17°C y 25°C, manifestando que se sostienen los núcleos anómalos negativos frente a la costa de Perú al sur de los 6°S, manteniéndose con hasta -4°C en los 8°S. Asimismo, se desarrollan pequeños núcleos positivos frente a la costa central por fuera de las 50 millas.




Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en el océano Pacífico. Los cuadros en azul son regiones Niño. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN





Figura 2. Izquierda: Temperatura (°C) superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Derecha: Anomalías de la temperatura superficial en el océano Pacífico Sur orient. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN.



## BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

### TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Lunes 3 Mayo 2021

Frente a toda la costa de Perú, la temperatura superficial del mar continuó presentando una tendencia clara al calentamiento respecto a los últimos días, dejando de predominar las condiciones frías de temperatura, aunque todavía presentan anomalías negativas en la mayoría de estaciones. Únicamente frente a la costa de Mollendo se aprecia una condición cálida de temperatura, alcanzando una anomalía de +1.2°C. La menor anomalía se registra frente a San Juan de Marcona con -0.8°C.

| Estación           | Temperatura Superficial del Mar TSM, (°C)" |      |            |      |            |      |            |      |
|--------------------|--------------------------------------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
|                    | 29/04/2021                                 |      | 30/04/2021 |      | 01/05/2021 |      | 02/05/2021 |      |
|                    | TSM                                        | ATSM | TSM        | ATSM | TSM        | ATSM | TSM        | ATSM |
| Talara             | 19.1                                       | -1.5 | 19.5       | -1.1 | 19.3       | -0.3 | 18.9       | -0.7 |
| Paita              | 19.2                                       | -1.0 | 18.4       | -1.8 | 19.0       | +0.2 | 18.9       | +0.1 |
| I. Lobos de Afuera | 17.0                                       | -3.1 | 16.7       | -3.4 | 17.0       | -2.5 | 17.4       | -2.1 |
| Salaverry          | 16.6                                       | -1.1 | 16.5       | -1.2 | 17.0       | -0.1 | 17.0       | -0.1 |
| Chimbote           | 18.1                                       | -3.2 | 18.5       | -2.8 | 18.3       | -1.9 | 20.2       | 0.0  |
| Callao             | 16.7                                       | -0.6 | 16.5       | -0.8 | 16.4       | -0.4 | 16.4       | -0.4 |
| San Juan           | 14.2                                       | -1.0 | 14.3       | -0.9 | 14.9       | +0.1 | 14.0       | -0.8 |
| Mollendo           | 16.3                                       | 0.0  | 16.7       | +0.4 | 16.7       | +0.8 | 17.1       | +1.2 |
| Ilo                | --                                         | --   | --         | --   | --         | --   | --         | --   |

Figura 3. Cuadro de la temperatura superficial del mar y anomalías (°C) de las estaciones oceanográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.

En la serie temporal de la temperatura superficial del mar en el litoral de Perú muestra un verano cálido de 2019 en el norte, particularmente a partir de febrero; mientras que, frente a el litoral centro y sur las condiciones se presentaron frías hasta el mes de mayo. A partir de junio disminuyeron las anomalías y se presentaron valores dentro del rango normal para los valores de temperatura. El aumento de la anomalía de temperatura durante el verano de 2019 se debió al efecto de la onda Kelvin cálida, pero que luego se vio atenuada y debilitada por la llegada de una onda Kelvin fría y la estacionalidad. En los meses de agosto y setiembre, las condiciones fueron cercanas a sus valores normales, mientras que para octubre y noviembre las condiciones cambiaron en el norte debido al ingreso de aguas cálidas y arribo de una onda Kelvin cálida. Finalmente, en diciembre se presentaron anomalías positivas en la costa norte y centro como producto de la última onda Kelvin que arribó y anomalías negativas frente a la costa sur. En el transcurso de julio del 2020, el efecto de una onda Kelvin fría, mantuvo las anomalías negativas frente a todo el litoral del Perú. En agosto y setiembre las condiciones frías se mantuvieron en el norte y parte del centro, como también en el extremo sur. Durante Octubre y noviembre se ha presentado un cuadro similar, mostrándose tendencias negativas térmicas, pero que no llegan a proyectar de forma contundente por toda la costa sur y parte de la central. Finalmente, durante esta primera quincena de diciembre se presentó una normalización de las condiciones frente a la costa peruana, aunque manteniéndose con valores ligeramente negativo. Durante enero y febrero se presentó un enfriamiento sobre la región Niño 1+2 y frente a la costa norte de Perú con gran intensidad; sin embargo, entre fines de febrero y durante marzo se presentó una normalización de las condiciones junto con un intenso calentamiento frente a la costa al norte de Paita, mientras que al sur se mantienen intensas anomalías negativas replegadas a la costa. Finalmente, con el inicio del otoño se volvieron a desarrollar condiciones frías de temperatura debido al acercamiento del núcleo negativo en el Pacífico central y los vientos, pero con el transcurso de la temporada se ha venido normalizando la condición frente a la costa de Perú.



## BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

### NIVEL MEDIO DEL MAR



Lunes 3 Mayo 2021



La DHN para el monitoreo del nivel del mar en tiempo real, cuenta actualmente con 11 estaciones mareográficas instaladas a lo largo del litoral peruano.

El nivel del mar frente a la costa de Perú al norte de Pisco mostró una tendencia a la disminución, aunque predominando valores de anomalía dentro del umbral de condiciones normales frente a toda la costa. Únicamente se mantienen las anomalías sin una tendencia clara frente a la costa de al sur de San Juan de Marcona y frente a Callao. Se registra la mayor anomalía frente a Talara con +4cm.

| Estación           | Nivel Medio del Mar (NMM, m) |       |            |       |            |       |            |       |
|--------------------|------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
|                    | 29/04/2021                   |       | 30/04/2021 |       | 01/05/2021 |       | 02/05/2021 |       |
|                    | NMM                          | ANMM  | NMM        | ANMM  | NMM        | ANMM  | NMM        | ANMM  |
| Talara             | 0.97                         | +0.07 | 0.96       | +0.06 | 0.95       | +0.05 | 0.94       | +0.04 |
| Paita              | 0.85                         | +0.02 | 0.84       | +0.01 | 0.82       | 0.00  | 0.82       | 0.00  |
| I. Lobos de Afuera | 0.87                         | +0.12 | 0.81       | +0.06 | 0.79       | +0.05 | 0.74       | 0.00  |
| Chimbote           | 0.69                         | +0.06 | 0.65       | +0.02 | 0.64       | +0.02 | 0.64       | +0.02 |
| Callao             | 0.53                         | -0.05 | 0.54       | -0.04 | 0.54       | -0.03 | 0.54       | -0.03 |
| Pisco              | 0.52                         | +0.03 | 0.49       | 0.00  | 0.47       | 0.00  | 0.47       | 0.00  |
| San Juan           | 0.44                         | 0.00  | 0.45       | +0.01 | 0.45       | +0.02 | 0.43       | 0.00  |
| Matarani           | 0.55                         | 0.00  | 0.53       | -0.02 | 0.54       | 0.00  | 0.55       | +0.01 |





Figura 4. Cuadro de nivel medio del mar y anomalías (m) de las estaciones mareográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.





**Figura 5.** Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Talara, Paíta, Isla Lobos y Chimbote del día 02-05-2021 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Los registros mareográficos provienen de las estaciones automáticas compuestas por un sensor de nivel tipo radar, marca Geónica modelo Datamar 2000C, de muestreo al segundo y registro promediado al minuto, con transmisión de información cada diez minutos vía red celular (GPRS), administrada por esta Dirección. A partir de estos registros, se pueden realizar investigaciones científicas como: las variaciones del nivel del mar durante Fenómenos como El Niño, La Niña, movimientos de la corteza terrestre y cambios climáticos; como agente modificador de la costa (transporte y sedimentación de material) y su influencia sobre el ecosistema de la zona intermareal, etc. Los mareógrafos también registran las manifestaciones de los seiches, bravezas de mar y tsunamis.



**Figura 6.** Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Callao, Pisco, San Juan y Matarani, del día 02-05-2021 Fuente: División de Oceanografía DHN.





## BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

### PRESIÓN Y OLAS

Lunes 3 Mayo 2021

Para el 04 de mayo el sistema de alta presión se mantendría alrededor de lo normal con presiones máximas de 1028 hPa, debido a una posición mas al sur que el patrón normal, se generaría un campo de viento con velocidades por debajo de las condiciones normales frente a la costa sur de Perú. El modelo WWATCH III para el 04 de mayo muestra frente de la costa norte de Perú vientos predominantes del sudeste, con magnitudes de 12 nudos a 16 nudos frente a la costa norte, en el centro de 12 nudos a 5 nudos y frente a la costa sur (Ilo) fluctuación de 6 nudos a 2 nudos. El mismo modelo, muestra frente a la costa del Perú un incremento de la altura de las olas de 1.2 m a 1.7 m, asociado a periodos de 12 s a 15 s.

[Ver aviso especial](#)







Figura 7. Sistema de Alta Presión del océano Pacífico Sur. Fuente: Datos: NCEP-NOAA; Gráficos: DHN





**Figura 8.** Series de tiempo de la velocidad del viento (nudos), altura de olas (m), periodo de la ola (s) e índice de la potencia del oleaje (Kw/m) frente a las costas de Talara, Callao e Ilo, del 03-05-2021 al 10-05-2021 Fuente: Datos: modelo WWATCH III; Grafico: DHN