



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Miércoles 16 Agosto 2023

El Pacífico ecuatorial, en la región occidental la temperatura alcanza los 30°C al oeste de los 170°W, en la región central entre 29°C y 26°C y en la región oriental entre 24°C y 28°C, continuando el desarrollo de condiciones sobre lo normal en todo la región del Pacífico ecuatorial, y registrándose una anomalía superior a 1°C, 2°C y 4°C al este de los 170°E, 170°W y 100°W, respectivamente. Manteniéndose las condiciones térmicas sobre toda la región ecuatorial, siendo la oriental donde se alcanzan las mayores anomalías. En la región adyacente a la costa sudamericana (región Niño 1+2), la temperatura muestra un valor predominante superior a 23°C dentro del área y de 22°C al norte de 04°S cerca de la costa sudamericana. Estos valores de temperatura continúan mostrando la presencia de núcleos cálidos anómalos en la región, con un promedio alrededor de 3°C y alcanzando 4°C al entre 02°S y 5°S, manteniendo una condición sobre lo normal. En el mar de Perú, la temperatura presentó valores entre 26°C y 16°C, manteniendo la intensidad de los núcleos positivos frente a la costa al norte de los 16°S; mientras que, al sur de esta latitud y por fuera de las 20 millas se presenta una condición dentro de lo normal. Los núcleos anómalos positivos se extienden por más de 200 millas frente a la costa norte y centro, alcanzando anomalías de 4°C por dentro de las primeras 100mn entre 06°S-15°S. Por otra parte, se presenta una disminución de la temperatura al norte de los 05°S cerca de la costa de Perú y dentro de las primeras 100mn frente a la costa de Ecuador.





Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en el océano Pacífico. Los cuadros en azul son regiones Niño. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN

DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN Dpto. de Oceanografía


Promedio de la Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar:
Agosto-15-2023



Global SST & Sea Ice Analysis, L4 OSTIA, 0.05 deg daily (METOFFICE-GLO-SST-L4-NRT-OBS-SST-V2)
Climatología: 2007-2022


DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN Dpto. de Oceanografía

Promedio de la Temperatura Superficial del Mar:
Agosto-15-2023



Global SST & Sea Ice Analysis, L4 OSTIA, 0.05 deg daily (METOFFICE-GLO-SST-L4-NRT-OBS-SST-V2)

Figura 2. Izquierda: Temperatura (°C) superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Derecha: Anomalías de la temperatura superficial en el océano Pacífico Sur orient. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Miércoles 16 Agosto 2023

Frente a gran parte de la costa de Perú, al norte de Talara y al sur de Chimbote exceptuando frente a Callao, se presenta una conservación de la temperatura del mar en los últimos 10 días, manteniéndose las anomalías positivas intensas con condición sobre lo normal. Mientras que, únicamente se registró una tendencia al calentamiento frente a Paita, y al enfriamiento frente a la costa entre la isla Lobos de Afuera y Callao, exceptuando frente a Salaverry. Asimismo, se registró una condición cálida frente a toda la costa. En promedio, las mayores anomalías se registraron frente a la costa centro, con hasta 5°C, y las menores frente a la costa sur.

Estación	Temperatura Superficial del Mar TSM, (°C)"							
	12/08/2023		13/08/2023		14/08/2023		15/08/2023	
	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM
Talara	21.1	+3.1	21.3	+3.3	21.2	+3.2	21.5	+3.5
Paita	19.9	+3.0	20.5	+3.6	20.4	+3.5	19.9	+3.0
I. Lobos de Afuera	22.0	+4.6	22.1	+4.7	21.9	+4.5	21.7	+4.3
Salaverry	21.9	+5.6	21.8	+5.5	21.3	+5.0	21.3	+5.0
Chimbote	22.1	+4.0	21.6	+3.5	23.1	+5.0	23.0	+4.9
Callao	20.0	+4.3	19.9	+4.2	19.9	+4.2	19.9	+4.2
San Juan	18.1	+4.2	18.3	+4.4	18.3	+4.4	18.1	+4.2
Mollendo	16.3	+1.4	16.9	+2.0	16.3	+1.4	16.7	+1.8
Ilo	17.5	+2.7	17.8	+3.0	18.3	+3.5	18.3	+3.5

Figura 3. Cuadro de la temperatura superficial del mar y anomalías (°C) de las estaciones oceanográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.

En la serie temporal de la temperatura superficial del mar en el litoral de Perú se registró un incremento de las anomalías, principalmente frente a la costa norte y centro, desde mediados de febrero que desarrollaron hasta la isoterma de 29°C frente a la costa y alcanzando anomalías de hasta +8°C durante marzo y abril. Para junio, las condiciones cálidas persistentes frente a la costa presentaron un nuevo incremento de las anomalías térmicas, manteniendo valores sobre los 4°C durante todo julio. Durante la primera mitad de 2023, durante febrero se habría terminado el evento de La Niña en la región central y desde diciembre 2022 La Niña Costera en la región del extremo oriental, para luego desarrollarse un rápido calentamiento frente a la costa de Perú por el arribo de ondas Kelvin cálidas, el debilitamiento del APS y la intensificación de las anomalías de vientos del oeste en la región oriental y el resto de Pacífico ecuatorial, por lo que se estableció la alerta El Niño Costero, por el probable desarrollo de este evento, teniéndose condiciones cálidas promedio a partir de febrero 2023 hasta la fecha.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

NIVEL MEDIO DEL MAR

Miércoles 16 Agosto 2023

La DHN para el monitoreo del nivel del mar en tiempo real, cuenta actualmente con 11 estaciones mareográficas instaladas a lo largo del litoral peruano.

El nivel del mar frente a la costa norte y centro de Perú, al norte de Pisco, durante los últimos diez días presentó una tendencia al incremento de sus valores, registrando un predominio de anomalías positivas y condiciones sobre lo normal. Mientras que, frente a la costa de San Juan de Marcona se presenta una conservación de nivel. Asimismo, se presenta una condición sobre lo normal frente a la costa al norte de Talara y entre Chimbote y Pisco. En promedio, las mayores anomalías se registraron frente a la costa centro con valores cercanos a 10cm, y las menores frente a la costa sur con condición dentro de lo normal.

Estación	Nivel Medio del Mar (NMM, m)							
	12/08/2023		13/08/2023		14/08/2023		15/08/2023	
	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM
Talara	0.83	-0.01	0.86	+0.02	0.86	+0.02	0.92	+0.08
Paíta	0.75	0.00	0.76	+0.01	0.79	+0.04	0.80	+0.05
I. Lobos de Afuera	--	--	--	--	--	--	--	--
Chimbote	0.64	+0.08	0.66	+0.10	0.70	+0.14	0.71	+0.15
Callao	0.50	-0.01	0.50	-0.01	0.54	+0.03	0.58	+0.07
Pisco	0.41	0.00	0.43	+0.02	0.44	+0.03	0.48	+0.07
San Juan	0.42	+0.04	0.41	+0.03	0.43	+0.05	0.42	+0.04
Matarani	--	--	--	--	--	--	0.52	+0.03

Figura 4. Cuadro de nivel medio del mar y anomalías (m) de las estaciones mareográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

PRESIÓN Y OLAS

Miércoles 16 Agosto 2023

Para el 17 de agosto el sistema de alta presión incrementaría a dentro del rango normal con presiones máximas de 1020hPa y ubicándose en una posición ligeramente al este de su posición normal; debido a esto, los vientos del sudeste se presentarían ligeramente intensos frente a la costa centro-sur de Perú. El modelo GFS-DODS/NCEP muestra que frente a la costa de Perú los vientos del sudeste incrementarían la intensidad de su magnitud frente a la costa centro y sur para los próximos días. El anticiclón del Pacífico sur tendría una composición zonal con un desarrollo hacia el sureste e incrementando su intensidad, aunque todavía con condición dentro del rango normal. El modelo WWATCH III para el 17 de agosto muestra frente a la costa norte de Perú vientos con magnitudes de 12 a 20 nudos frente a la costa norte, en el centro de 09 a 16 nudos y frente a la costa sur (Ilo) fluctuación de 09 a 13 nudos. El mismo modelo, muestra frente a la costa norte y centro del Perú un incremento de la altura de las olas de 1.3m a 1.6m, y frente a la sur un decaimiento de 1.3m a 1.0m, asociado a periodos de 12 s a 14 s.

[Ver aviso especial](#)






Figura 7. Sistema de Alta Presión del océano Pacífico Sur. Fuente: Datos: NCDC-NCEP/NOAA; Gráficos: DHN






Figura 8. Series de tiempo de la velocidad del viento (nudos), altura de olas (m), periodo de la ola (s) e índice de la potencia del oleaje (Kw/m) frente a las costas de Talara, Callao e Ilo, del 16-08-2023 al 23-08-2023 Fuente: Datos: modelo WWATCH III; Grafico: DHN