



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Lunes 12 Mayo 2025

El Pacífico ecuatorial, temperaturas entre 30 y 28°C se distribuyeron dentro de la región occidental; mientras que, temperaturas entre 29°C-26°C y 29°C-20°C se registraron en las regiones central y oriental, respectivamente, observándose anomalías negativas predominantes de -0.5°C entre los 160°E y 120°W y hasta -1°C desde los 120°W hasta continente, predominando valores negativos sobre toda la región del Pacífico ecuatorial. Sin embargo, en la región oriental, estos núcleos alcanzan una mayor intensidad a -1°C, aunque también se presentan algunos núcleos de anomalía positiva desde los 095°W hasta la costa de Sudamérica, registrando valores de hasta +2°C. En promedio, los núcleos negativos vienen presentando una normalización en el Pacífico central. En la región adyacente a la costa sudamericana (región Niño 1+2), la temperatura muestra un rango de valores entre 27°C y 20°C dentro del área y sobre 23°C al norte de 04°S cerca de la costa sudamericana. Estos valores de temperatura muestran una normalización de los núcleos de anomalía negativa y positiva sobre la región, promediándose una temperatura dentro de lo normal. En el mar de Perú, la temperatura presentó valores entre 26°C y 15°C, presentando una condición fría frente a la costa centro y sur, desarrollando anomalías negativas de hasta -2°C con una extensión alrededor de 100 millas al sur de los 06°S. Frente a la costa norte se presenta una condición entre normal y ligeramente fría, registrando anomalías entre -0.5°C y -1°C con alcance oceánico.

Image not found or type unknown




Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en el océano Pacífico. Los cuadros en azul son regiones Niño. Fuente: Datos: NCDCNCEP/NOAA; Gráficos: DHN

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown




Figura 2. Izquierdo: Temperatura (°C) superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Derecha: Anomalías de la temperatura superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Fuente: Datos: NCDC-NCEP/NOAA; Gráficos: DHN.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Lunes 12 Mayo 2025

Frente a casi toda la costa de Perú, exceptuando entre Paita y la isla Lobos de Afuera e Ilo, se presenta una conservación de la temperatura en los últimos 10 días; mientras que, una tendencia al enfriamiento frente a la costa de Paita y al calentamiento frente a la isla Lobos de Afuera y la costa de Ilo. Frente a la costa de Perú, predominan temperaturas dentro del rango de condición normal, desarrollando únicamente condición fría frente a la costa Talara; mientras que, condición cálida frente a la costa de Paita. En promedio, las mayores anomalías se registraron frente a la costa centro y las menores frente a la costa sur.

Estación	Temperatura Superficial del Mar TSM, (°C)"							
	08/05/2025		09/05/2025		10/05/2025		11/05/2025	
	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM
Talara	17.4	-2.2	17.3	-2.3	17.1	-2.5	17.1	-2.5
Paita	20.1	+1.3	20.2	+1.4	20.1	+1.3	20.1	+1.3
I. Lobos de Afuera	20.1	+0.6	20.2	+0.7	20.1	+0.6	20.0	+0.5
Salaverry	17.8	+0.7	17.8	+0.7	18.0	+0.9	17.9	+0.8
Chimbote	19.5	-0.7	19.5	-0.7	19.5	-0.7	19.4	-0.8
Callao	16.9	+0.1	17.0	+0.2	17.6	+0.8	17.3	+0.5
San Juan	14.4	-0.4	14.5	-0.3	14.6	-0.2	14.7	-0.1
Mollendo	16.7	+0.8	16.9	+1.0	16.0	+0.1	15.2	-0.7
Ilo	15.6	-0.6	15.5	-0.7	15.8	-0.4	16.0	-0.2

Figura 3. Cuadro de la temperatura superficial del mar y anomalías (°C) de las estaciones oceanográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.

En la serie temporal de temperatura, se observó una condición fluctuante entre fría y normal frente a la costa de Perú, inclusive desarrollando núcleos positivos intensos; sin embargo, durante enero 2025 se volvió a presentar un enfriamiento sostenido frente a la costa de Perú, más no en la región 1+2; así como, en la región central se presentaba un valor anómalo promedio mensual negativo desde agosto 2024, y alcanzando condición fría en promedio a partir de diciembre 2024. Sin embargo, a partir de febrero, se viene presentando un declive de estas anomalías frías a valores entre normal y positivos en el Pacífico oriental. Desde fines de 2024 e inicios de 2025, a partir de Diciembre se viene desarrollando una intensificación de los núcleos negativos en la región del Pacífico central, esperándose el desarrollo de la fase fría de El Niño, más conocida como La Niña aunque de corta duración, registrándose condición fría según el ONI desde diciembre, mientras que el ICEN se mantiene con condición neutra hasta enero 2024, después incrementando ligeramente debido al calentamiento



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

NIVEL MEDIO DEL MAR

Lunes 12 Mayo 2025

La DHN para el monitoreo del nivel del mar en tiempo real, cuenta actualmente con 11 estaciones mareográficas instaladas a lo largo del litoral peruano.

El nivel del mar frente a gran parte de la costa de Perú, al norte de Chimbote y al sur de San Juan de Marcona exceptuando la isla Lobos de Afuera, durante los últimos diez días presentó una tendencia al incremento de nivel que mantuvo predominantes las anomalías positivas; mientras que, disminuyó frente a la costa de Pisco. En el litoral de Perú, predominan anomalías positivas de nivel, principalmente frente a la costa norte. Se observa una condición de sobre lo normal entre la isla Lobos de Afuera y Chimbote. En promedio, las mayores anomalías se registraron frente a la costa norte, observándose un núcleo positivo intenso, y las menores frente a la costa centro.

Estación	Nivel Medio del Mar (NMM, m)							
	08/05/2025		09/05/2025		10/05/2025		11/05/2025	
	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM
Talara	0.99	+0.06	1.01	+0.08	1.01	+0.08	1.00	+0.07
Paita	0.89	+0.05	0.92	+0.08	0.92	+0.08	0.91	+0.07
I. Lobos de Afuera	0.92	+0.16	0.93	+0.17	0.94	+0.18	0.94	+0.18
Chimbote	0.70	+0.06	0.69	+0.05	0.71	+0.07	0.71	+0.07
Callao	0.54	-0.05	0.56	-0.03	0.56	-0.03	0.55	-0.04
Pisco	0.47	0.00	0.47	0.00	0.49	+0.02	0.46	-0.01
San Juan	0.47	+0.03	0.46	+0.02	0.47	+0.03	0.47	+0.03
Matarani	0.58	+0.03	0.59	+0.04	0.58	+0.03	0.57	+0.02

Figura 4. Cuadro de nivel medio del mar y anomalías (m) de las estaciones mareográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

PRESIÓN Y OLAS

Lunes 12 Mayo 2025

Para el 13 de mayo el sistema de alta presión disminuiría a dentro del rango normal con presiones máximas de 1020hPa y ubicándose al sureste de su posición normal; debido a esto, los vientos del sudeste se presentarían con intensidad de dentro de lo normal frente a toda la costa de Perú. El modelo GFS-DODS/NCEP muestra que los vientos del sureste disminuirían la intensidad de su magnitud frente a la costa norte y sur para los próximos días, presentándose ligeramente por debajo de su normal frente a la costa norte y sur, y dentro de lo normal frente a la centro. El anticiclón del Pacífico sur tendría una composición zonal con un desarrollo hacia el oeste e incrementando su intensidad, esperándose sobre su normal y en posición al suroeste de su normal. El modelo WWATCH III para el 13 de mayo muestra frente a la costa norte de Perú vientos con magnitudes de 11 a 18 nudos frente a la costa norte, en el centro de 05 a 11 nudos y frente a la costa sur fluctuación de 04 a 14 nudos. El mismo modelo, muestra frente a la costa norte y centro de Perú una tendencia al decaimiento de la altura de las olas de 1.7m a 1.3m; mientras que, frente a la costa sur sería de 1.9m y 1.7m, asociado a periodos de 12 s a 15 s. [Ver aviso especial](#)

Image not found or type unknown




Figura 7. Sistema de Alta Presión del océano Pacífico Sur. Fuente: Datos: NCDC-NCEP/NOAA; Gráficos: DHN

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown







Figura 8. Series de tiempo de la velocidad del viento (nudos), altura de olas (m), periodo de la ola (s) e índice de la potencia del oleaje (Kw/m) frente a las costas de Talara, Callao e Ilo, del 12-05-2025 al 19-05-2025 Fuente: Datos: modelo WWATCH III; Grafico: DHN